

lissime seriatim punctulatis et subpuberulis, setulis vix perspicuis, pedibus elongatis. Beirut (Appl): **syriacum** Rtrr.

- 1' Longitudine sine rostro 2 mm, lat. $\frac{4}{6}$ mm. Elytris (quam tota superficie) deplanatis, prope basin parum angustatis (non constrictis), angulis humeralibus parum prominulis, basi leviter bisinnatis, lateribus parallelis, supra mediocriter punctato-striatis, stria suturali haud magis impressa, interstitiis angustioribus, densissime seriatim punctulatis et subpuberulis, setulis vix perspicuis, pedibus mediocribus Chaifa.

Simoni nov. sp.*)

*) Exemplar unicum ab amico Domino von Heyden meae collectioni dono datum, a Domino Simon, in ejus honorem hanc speciem singularem nominavi, repertum.

Synonymisches über die Coleopteren-Gattung *Danacaea* Lap.

Von J. Prochaska in Mistek (Mähren).

Danacaea pallidipalpis Abeille, Echange, 1894. 93 = *Reyi* Proch.

D. opacula Ab. ist eine Art die zwischen *cusanensis* und *tomentosa* zu stellen wäre; sie dürfte aber auf ein kleines Exemplar der *tomentosa* gegründet sein.

D. minuta Pic = *aphytoides* Schilsky-Proch.

D. Leprieuri Pic ist höchstens eine Var. von *Poupillieri* mit schwacher Verdunkelung der Fühlerspitze.

D. nigritarsis Küst. var. *longipilis* Pic ist zu verwerfen.

D. viridescens Pic = *distincta* Luc.; der Autor hält für *distincta* die *aurichalcea* Küst., welche ihm fehlt.
